



Проект «Мать и дитя»



Институт Здоровья Семьи


Практика ведения родов у женщин с ВИЧ-инфекцией

Н.В. Вартапетова, А.В.Карпушкина,
В.Н.Садовникова, M. L. Mantz, A. Fullem

EECAAC2008

Исследование в Пермской, Тюменской, Оренбургской, Иркутской и Мурманской областях, Хабаровском, Алтайском и Красноярском краях


- Опрос 458 женщин, поступивших в медучреждения по поводу родов или аборта с мая по октябрь 2005 года
- Изучение 2528 историй родов и абортс с января 2002 по октябрь 2005 года



Социально-демографические характеристики женщин (опрос 261 женщин с ВИЧ, данные 1457 историй родов, %)

- Средний возраст – 24 года (от 15 до 39 лет)
- Законченное среднее образование и выше - 86%
- Настоящая беременность не запланирована – 54%
- Постоянное место жительства в регионах исследования – 100%

Распространенность сопутствующих инфекций у женщин с ВИЧ (данные 1457 историй родов, %)



Гепатит С 83%

Герпес 34%

Установление ВИЧ статуса (данные 1457 историй родов)

- До настоящей беременности – 51%
- Во время настоящей беременности – 37%
- Во время родов – 4%
- После родов – 6%

Проведение профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку (опрос 261 женщины и данные 1457 историй родов, %)

Проведение профилактики	Карты родов 2002-2005	Опрос женщин в 2005
АРВ во время беременности	66	74
АРВ в родах	84	87
АРВ ребенку	95	91
Кесарево сечение	14	15
• <i>из них плановое</i>	9	
Искусственное вскармливание	97	96



Проект «Мать и дитя»



Институт Здоровья Семьи


АРВ-препараты, используемые в родах у женщин с ВИЧ (данные 1228 историй родов)

- Азидотимедин – 58%
- Невирапин – 43%
- Фосфазид – 1%

Причины отсутствия АРВ-профилактики в родах (данные 225 историй родов)

- Диагностика ВИЧ после родов – 40%
- Поступление в родах – 20%
- Роды на дому или в машине СП – 9%
- Отсутствие АРВ-препаратов в роддоме – 5%
- Другое – 7%
- Неизвестно – 19%

Частота осложнений в зависимости от метода родоразрешения женщин с ВИЧ-инфекцией (данные 1457 историй родов, %)



Осложнения вагинальных родов:

- Разрывы – 41%
- Преждевременное излитие вод – 40%
- Слабость родовой деятельности – 23%
- Кровотечения – 6%
- Другие – 28%



Проект «Мать и дитя»



Институт Здоровья Семьи

Частота использования процедур, увеличивающих риск передачи ВИЧ в родах:

- Инвазивные процедуры – 80%
- Неприятные рутинные клинически необоснованные процедуры – 64%





USAID
ОТ АМЕРИКАНСКОГО НАРОДА

Проект «Мать и дитя»




Институт Здоровья Семьи

Приоритетный национальный проект в сфере здравоохранения «Профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявление и лечение больных ВИЧ»

КЛИНИКО-ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ОТ МАТЕРИ РЕБЕНКУ



Издание третье

Москва - 2006

Информационно-образовательный вестник

Здоровье **С**емьи 3/2007

Кесарево сечение как метод профилактики вертикальной передачи ВИЧ





ИЗС
Институт
Здоровья
Семьи

Институт Здоровья Семьи (ИЗС) – российская неправительственная организация, работающая в области здравоохранения и социальной защиты, основной целью которой является улучшение здоровья женщин, мужчин, детей и семей в целом. ИЗС предоставляет и внедряет программы, направленные на повышение знаний и навыков материнское и социальное воспитание, руководящий просвещение, профилактика инфекциям: ВИЧ и гепатитов по оказанию современной качественной протективной и лечебной помощи. В своей деятельности ИЗС опирается на данные, полученные в научных, просветительных и образовательных учреждениях, государственные и негосударственные учреждения, а также на опыт партнеров. В настоящее время ИЗС реализует программы в области профилактики ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, а также в области профилактики материнского и младенческого ВИЧ-инфекции. В настоящее время ИЗС реализует программы в области профилактики ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, а также в области профилактики материнского и младенческого ВИЧ-инфекции.

С более подробной информацией о деятельности ИЗС можно ознакомиться на веб-сайте: www.izs.ru.

Приоритетный национальный проект «Здоровье»

Система оценки готовности медицинских учреждений проводить профилактику передачи ВИЧ от матери ребенку в родильных домах, женских консультациях и детских поликлиниках

- Руководство
- Анкеты



Система оценки готовности медицинских учреждений первичного звена проводить профилактику передачи ВИЧ от матери ребенку (ППМР)

Руководство по проведению оценки медицинской помощи по ППМР в женских консультациях, родильных домах и детских поликлиниках